



2 Bis rue de l'église
17430 LUSSANT
05.46.84.52.95

COMPTE-RENDU de la REUNION du 15 février 2007
Hôtel des Remparts – ROCHEFORT
20 h 00 – 23 h 00

Présents : Drs Baland, Barrier, Binder, Bonnet, Clauzet, Dezeix, Lebigre, Lecroart, Reynaud, Sorbé, Sorrentino, Valette, Martin (IMG), Mme Greseau du laboratoire Schering Plough.

Après une présentation de chacun, Gilles SORBE présente l'enquête MG-TOX 2006 sur 245 fiches exploitables réalisée en décembre auprès des patients consommant des substances illicites et vus en médecine générale.

A propos du questionnaire, peu de remarques, Patrick Lebigre souligne l'intérêt de poser la question des antécédents de produits illicites aux patients tout venant car on a parfois des surprises inattendues.

Parmi l'ensemble des données exposées ci après on a retenu :

- l'importance des doubles prises de Buprénorphine : 30 % des patients ! Il faudrait voir si cette donnée est corrélée avec les posologies et les mésusages.
- la fréquence des ordonnances avec chevauchements : 20%
- sinon pas de grands changements par rapport à l'an dernier, les patients prennent de l'âge, comme nous !

Gilles Sorbé a présenté ensuite quelques données issues du rapport de l'OFDT qui corroborent tout à fait nos données locales.

Enfin, Madame Gréseau a présenté les principales caractéristiques de la spécialité SUBOXONE^o.

On relève que cette spécialité :

- est finalement réservée aux mésusages surtout injecteurs.
- est limitée à deux dosages 2mg et 8mg
- est non sécable ce qui pose la question du mode de diminution
- bénéficierait grandement d'un arrêt de production de la Buprénorphine, ce qui semble illusoire

En bref, il y a quand même pas mal d'incertitudes mais une curiosité sans grand enthousiasme.

Philippe Binder

ETUDE CONSO 2006

9 médecins ont répondu à l'enquête déclenchée par le réseau et ont reçu au moins une fois au cours du mois 245 patients pour usage d'une ou de drogues illicites.

PROFIL PATIENT

78,3% d'homme
Moyenne d'âge 34 ans (de 16 à 60 ans)
37,5% sont sans travail
18% ont un travail irrégulier
44,5% ont un travail fixe
Pas de différences significatives entre hommes et femmes.

PROFIL CONSOMMATION

Ont déjà consommé

des opiacés	81%
de la cocaïne	82%
de l'ecstasy	59%
des benzo	54,7%
des psychotropes	59,6%
de la méthadone	15,5%
du subutex	89,9%
du cannabis	84,7%
du tabac	93%
ont déjà été ivres	85%

Les femmes sont ou ont été moins consommatrices d'opiacés ou d'ecstasy, plus consommatrices de BZH ou de cocaïne.

Consomment actuellement

des opiacés	15,5% dont 3% quotidiennement
de la cocaïne	11,4% dont 0,4 quotidiennement (1)
de l'ecstasy	2,4% dont 0 quotidiennement
de BZH	13,1% dont 9,4 quotidiennement
des psychotropes	34,2% dont 32 quotidiennement
du subutex	80,4% dont 78 quotidiennement
du cannabis	66,5% dont 21 quotidiennement
du tabac	96% dont 80 quotidiennement
méthadone	7,3% dont 7 quotidiennement

32% déclarent des ivresses régulières dont 2,4% quotidiennes.

PROFIL SUBSTITUES

192 prennent du Sutubex
17 prennent de la Méthadone

La dose moyenne de Subutex est de 7,5 mg (de 0,1 à 22 mg)

50,5% ont moins de 8 mg
16,7% ont 8 mg
32,8% ont plus de 8 mg
1% (3) ont plus de 16 mg

Ceux qui travaillent	ont	6,7 mg
Ceux qui ne travaillent pas	ont	9,14 mg

Différence entre MG

Caron	3,3 mg
Valette	4,4 mg
Lebigre	5,5 mg
Sorbé	5,8 mg
Binder	7,3 mg
Dezeix	10 mg

Ils sont substitués depuis en moyenne 5,6 ans
55% sont substitués depuis plus de 5 ans
31% sont substitués depuis le début du Subutex
25% le sont depuis moins de 2 ans
31,4% se sont déjà procuré du Subutex hors pharmacie
68% ne se sont jamais injecté ce produit mais 6,6% l'ont fait au cours du dernier mois
38,5% ont déjà sniffé le subutex

Le traitement de Subutex a déjà été arrêté pour 47,5% des patients, 18% moins d'un mois, 11% entre 1 et 3 mois, 8% plus de 3 mois.

Il y a chevauchement d'ordonnances dans 19% des consultations.

Le mode de prise se confirme et est en concordance avec d'autres études : seuls 59% font une monoprise, 30% font 2 prises et 8% trois prises !

PROFIL SEROLOGIQUE

	HIV	Hépatite C	Hépatite B
positif	3,2%	36%	62%
négatif	87,5%	52,6%	20%
Inconnu	7,8%	9%	10%

Si VHC +

27,3% ARN ?
60% positif
28% négatif
11,4% traitement fini

Si VHC + moyenne d'âge 37,54 ans 76,5% d'hommes
Si VHC - moyenne d'âge 30,8 ans 71% d'hommes

Pour les plus de 45 ans, 89,5 % des VHC sont positives et 100% des ARN sont connus

PROFIL ACCOMPAGNEMENT

36,5% n'ont jamais rencontré de psy
11% en ont rencontré un ce mois
38% n'ont jamais rencontré un socio éducatif
12% en ont rencontré un ce mois

A noter que pour 1 patient sur 5, le médecin qui recueille les données n'est pas le médecin traitant habituel de ce patient qui le consulte donc spécifiquement pour sa toxicomanie.

PAR RAPPORT AUX ANNEES PRECEDENTES :

1 peu plus de femmes
1 peu plus âgés
1 peu plus de chômage avec un peu plus de travail irrégulier

Pour les consommations :
9% de cocaïne en plus
9% d'opiacés en moins
un peu moins d'ivresse
Dose moyenne de Subutex stable

Nos substitués sont fidèles et ne décrochent pas de 48% à 55% de substitution > 5 mg

Sérologies stables avec < 10% d'inconnus

Suivis socio éducatif et psy stables

Stabilité des multi prise de Subutex aux alentours de 40%.